

**Si tiene alguna pregunta,
por favor consulte con su
medico o llame al programa
del cuidado para el cáncer a
Hearst Cancer Resource Center
al 805.542.6234.
Para emergencias, llame al 911.**

EDUCACION PARA PACIENTES

Abraxane (Paclitaxel protein-bound)

EFECTOS SECUNDARIOS

Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetas médicas cuidadosamente.

- **Recuento globular bajo** – Los glóbulos blancos y rojos podrían bajar temporariamente lo cual puede aumentar sus riesgos de contraer infecciones y/o anemia
- **Pérdida de Pelo**
- **Náusea**
- **Electrocardiograma anormal (ECG)**
- **Neuropatía periférica** – entumecimiento u hormigueo en manos y pies
- **Artralgia y mialgia (dolor temporario de articulaciones y músculos)**
- **Debilidad física y fatiga**
- **Análisis de sangre para las funciones del hígado elevados**
- **Infección**
- **Diarrea**
- **Vómito**
- **Herpes bucales**
- **Hinchazón de los pies o tobillos**
- **Falta de aliento**
- **Problemas de los ojos**

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

Notifique inmediatamente a su doctor o enfermera especializada en oncología si tiene estas dificultades:

- Escalofrío o fiebre más alta de 100.5°F
- Si el lugar donde recibió su inyección está rojo, dolorido, o hinchado
- Náusea
- Vómito (mas de 4-5 veces en un período de 24 horas)
- Diarrea (mas de 4-6 episodios en un período de 24 horas)
- Moretones raros o hemorragia
- Sangre en el excremento o si está negro o muy obscuro
- Fatiga excesiva
- Herpes bucales
- Si se siente entumecido o tiene sensación de hormigueo en los dedos de las manos o pies
- Señal de infección: Enrojecimiento o hinchazón, dolor al tragar, toser con flemas, o dolor al orinar

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- **Métodos anticonceptivos** son necesarios durante y por 4 meses después del tratamiento porque el tratamiento puede modificar la esperma y los óvulos.
- **Antes de cualquier consulta dental, dígame a su dentista que está tomando esta medicina.**