French Hospital Medical Center.
A Dignity Health Member

Si tiene alguna **pregunta, por favor consulte con su medico o llame al programa del cuidado para el cáncer de Hearst Cancer Resource Center al 805.542.6234.**
Para emergencias, llame al 911.

EDUCACION PARA PACIENTES

Avastin (Bevacizumab)

EFECTOS SECUNDARIOS

Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetas médicas cuidadosamente. Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:

- **Debilidad en general**
- **Dolor**
- **Dolor en el abdomen**
- **Náusea y vómito**
- **Menos apetito**
- **Estreñimiento**
- **Infecciones respiratorias**
- **Recuento de glóbulos blancos bajo (Aumento del riesgo para infección)**
- **Proteinuria (Presencia de proteínas en la orina)**
- **Sangre por la nariz**
- **Diarrea**
- **Pérdida de pelo**
- **Herpes labiales**
- **Dolor de cabeza**
- **Siente que pierde el aliento**
- **Mareos**
- **Presión arterial alta**
- **Pérdida de peso**
- **Dolores musculares**

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

Notifique inmediatamente a su doctor o enfermera especializada en oncología si tiene estas dificultades :

- Escalofrío o fiebre más alta de 100.5°F
- Hemorragia
- Falta de aliento; dificultad al respirar
- Hinchazón de los pies o tobillos; rápido aumento de peso
- Dolor en el abdomen
- Náusea
- Vómito (mas de 4-5 veces en un período de 24 horas)
- Diarrea (mas de 4-6 episodios en un período de 24 horas)
- Estreñimiento
- Toser con sangre
- Sangre en el excremento o si está negro o muy obscuro
- Sangre en la orina
- Herpes labiales
- Hinchazón, enrojecimiento y/o dolor en una pierna o brazo y no en el otro
- Señal of infección; Enrojecimiento o hinchazón, dolor para tragar, toser con flemas, o dolor al orinar
- Pérdida de apetito por 24 horas
- Deshidratación

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- **Métodos anticonceptivos** son necesarios durante y por 4 meses después del tratamiento porque el tratamiento puede modificar la esperma y óvulos.
- **Antes de cualquier consulta dental, dígale a su dentista que está tomando esta medicina.**