French Hospital Medical Center.
A Dignity Health Member

Si tiene alguna **pregunta, por favor consulte con su medico o llame al programa del cuidado para el cáncer a Hearst Cancer Resource Center al 805.542.6234.**

EDUCACION PARA PACIENTES

Bleomycin (Blenoxane)

EFECTOS SECUNDARIOS

Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetas médicas cuidadosamente. Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:

- **Náusea y vómito** – Esto no es común pero puede venir en las primeros 24 horas después de tomar esta medicina.
- **Herpes bucales** – La gravedad de este síntoma varía en cada paciente – Es posible que su boca se vea más roja y se sienta adolorida aproximadamente 10 días después de tomar esta medicina. Es importante mantenga la higiene de su boca para que se sienta mejor y para prevenir infecciones. Use cepillos de dientes suaves. Si tiene dificultad al comer, tal vez el doctor puede recetarle una medicina que le puede ayudar a disminuir algunas de las molestias durante sus comidas. Comidas suaves, poco condimentadas, y tibias pueden ser más faciles de comer.
- **Fiebre** – Puede ocurrir en las primeras 24 horas después de tomar la medicina. Pregúntele a su doctor si puede tomar Tylenol para controlar o prevenir fiebre.
- **Dolor del Tumor** – Es possible que sienta dolor en la área del cancer.
- **Cambios de la piel y las uñas** – Es possible que note que su piel se vea mas oscura o roja. También puede desarollar líneas como estrias, úlceras, o callos en los codos, manos, dedos, o pies. El color de las uñas tambien puede cambiar. Puede notar crestas en las uñas.
- **Cambio en los pulmones** – Puede empezar a sentir falta de aliento debido a las cicatrices del tejido pulmonar. Por esta razón, la dosis total de esta medicina está calculada con mucho cuidado y puede ser posible que le pidan radiografias del pecho y análisis de la función pulmonar.

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

Notifique inmediatamente a su doctor o enfermera especializada en oncología si tiene estas dificultades:

- Cualquier dificultad al respirar y tos seca, sin flema
- Herpes labiales y úlceras en la boca
- Debilidad que no sea normal, mareo, falta de aliento, silbidos al respirar, comezón, o confusión en las primeras 24 horas después de recibir su medicina.
- Signos de infección: Escalofríos o fiebre por encima de 1005 F, tos nueva o fuerte, falta de aliento, dolor o ardor al orinar, úlcera roja e hinchada o zonas blancas en la boca o en la lengua

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- **Métodos anticonceptivos** son necesarios durante y por 4 meses despues del tratamiento porque el tratamiento puede modificar la esperma y los óvulos.
- **Antes de cualquier consulta dental, dígale a su dentista que está tomando esta medicina.**
- Es posible que le den una dosis de prueba antes de recibir esta medicina.