

Si tiene alguna **pregunta**,
**por favor consulte con su
medico o llame al programa
del cuidado para el cáncer a
Hearst Cancer Resource Center
al 805.542.6234.**
Para emergencias, llame al 911.

EDUCACION PARA PACIENTES

CisPlatin (Platinol, Platinol AQ, Cis Platinum)

EFFECTOS SECUNDARIOS

Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetas médicas cuidadosamente. Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:

- **Náusea/Vómito** – Puede ocurrir una hora después de recibir esta droga y puede continuar por aproximadamente 4 días. Se le dará medicación para ayudar a controlar o prevenir estas molestias. **ES MUY IMPORTANTE QUE TOME ESTA MEDICINA AL PIE DE LA LETRA PARA EVITAR ENFERMARSE.**
- **Daño a los riñones** – Esta droga puede dañar los riñones. Por ese motivo, recibirá líquidos por vía intravenosa para tratar de prevenir esto. La función de sus riñones será evaluada por medio de exámenes de sangre y orina durante el tiempo que tome esta droga.
- **Perida de la audición** – Puede tener un sonido de silbidos en los oídos o pérdida de audición en frecuencias altas.
- **Recuento globular bajo** – Puede ocurrir 1-2 semanas después de recibir esta droga. Durante este tiempo, usted estará más propenso a catarrros, infecciones, y hemorragias. Se pueden hacer análisis de sangre para evaluar su recuento globular.
- **Daño a los nervios** – Puede sentirse entumecido o sentir una sensación de hormigueo en los dedos de las manos y los pies. Esto es raro pero será evaluado.
- **Perdida de pelo** – Pérdida leve del pelo puede ocurrir pero crece otra vez cuando el tratamiento termina.
- **Cambios en el sentido del gusto o pérdida de apetito** - Puede sentir un sabor metálico en la boca.
- **Fatiga** – Este es un síntoma secundario relacionado con el efecto de la droga en los riñones.

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

Notifique a su doctor o enfermera especializada en oncología inmediatamente si tiene estas dificultades:

- Zumbidos en los oídos, si no puede oír que el refrigerador trabaja, o el canto de los pájaros.
- Si se siente entumecido o tiene sensación de hormigueo en los dedos de las manos o pies o si tiene problemas con su coordinación de movimientos.
- Señal de infección: Escalofrío o fiebre más alta de 100.5°F, tos nueva o agravada o falta de aliento, dolor o ardor al orinar, un herpes hinchado o rojo; áreas blancas en la boca o en la lengua
- Cualquier inflamación de los pies o la parte baja de las piernas o si tiene cambios en la manera que orina.
- Si el lugar donde recibió su inyección está rojo, dolorido, o hinchado.
- Falta de aliento o si tiene problemas con su respiración.
- Sangre en la orina o en el excremento.

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- **Métodos anticonceptivos** son necesarios durante y por 4 meses después del tratamiento porque el tratamiento puede modificar la espermia y los óvulos.
- **Antes de cualquier consulta dental, dígame a su dentista que está tomando esta medicina.**
- **Aumente la ingestión de líquidos** – Beba 8-10 vasos de líquidos al día.