French Hospital Medical Center.
A Dignity Health Member

Si tiene alguna **pregunta, por favor consulte con su medico o llame al programa del cuidado para el cáncer a Hearst Cancer Resource Center al 805.542.6234.**
Para emergencias, llame al 911.

EDUCACION PARA PACIENTES

Cytoxan (Cyclophosphamide)

EFECTOS SECUNDARIOS

Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetas médicas cuidadosamente. Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:

- **Recuento globular bajo** – Es temporal y ocurre normalmente 8 -15 días después del tratamiento. Durante este tiempo, usted estará más propenso a catarros, infecciones, y hemorragias. Se pueden hacer análisis de sangre para evaluar su recuento globular.
- **Náusea y Vómito** – Puede empezar 3-6 horas después del tratamiento. Se le dará medicación para ayudar a controlar o prevenir estas molestias.
- **Irritación de la vejiga** – Tiene que tomar por lo menos 2 ½ litros de liquidos, de preferencia aqua, el día que reciba esta droga y el dia siguiente.
- **Herpes labiales** – Pueden salir 1-2 semanas después de recibir la droga. Tal vez su boca se ponga roja o inflamada. También pueden aparecer manchas blancas o úlceras.
- **Péridada de apetito o cambios del gusto** – Tal vez la comida no sabrá bien o tal vez no tendrá ganas de comer. Si esto sucede, hable con el doctor o enfermera para que le den recomendaciones de nutrición.
- **Pérdida de pelo** – Este efecto es temporarario y empieza aproximadamente 10-21 días después del tratamiento.
- **Infertilidad** – Puede ser que su recuento de esperma (hombre) disminuya o que ocurran cambios en su ciclo menstrual (mujer) que sean permanentes. **De todas maneras, usted necesita continuar usando métodos anticonceptivos.**
- **Cambios pulmonares** - Puede notar falta de aliento más a menudo y/o tos después de haber tomado Cytoxan por un tiempo prolongado. Notifique a su médico o enfermera si tiene cualquiera de estos síntomas.

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

Náusea o **Notifique a su doctor o enfermera especializada en oncología inmediatamente si tiene estas dificultades:**

- Vómito que no puede controlar o si no puede comer o beber por 24 horas
- Sangre en el excremento o en la orina, moretones raros, o sangre por la nariz
- Señal de infección: Escalofrio o fiebre más alta de 100.5°F, tos nueva o agravada o falta de aliento, dolor o ardor al orinar, un herpe inchado o rojo; áreas blancas en la boca o en la lengua
- Si siente ardor cuando orina o si parece que hay sangre en la orina; si cambia la cantidad de orina
- Herpes labiales o úlceras
- Si le cuesta trabajo respirar o si nota que tiene tos fuera de lo normal.

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- **Tome 10-12 vasos de líquidos durante los días que reciba esta droga** – Su cuerpo desecha esta droga por medio de la orina, así que es muy importante que tome muchos líquidos antes y después el tratamiento y que orine frequentemete después del tratamiento.
- **Métodos anticonecptivos** son necesarios durante y por 4 meses despues del tratamiento porque el tratamiento puede poner en peligro la salud del esperma y óvulos.
- **Antes de cualquier consulta dental, dígale a su dentista que está tomando esta medicina.**