French Hospital Medical Center.
A Dignity Health Member

Si tiene alguna **pregunta, por favor consulte con su medico o llame al programa del cuidado para el cáncer a Hearst Cancer Resource Center al 805.542.6234. Para emergencias, llame al 911.**

EDUCACION PARA PACIENTES

Daunorubicin (Daunomycin, Cerubidine)

EFECTOS SECUNDARIOS

Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetas médicas cuidadosamente. Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:

- **Náusea y vómito** – Es común que ocurra 1-3 horas después del tratamiento y puede durar por 24 horas. Antes del tratamiento se le dará medicación para ayudar a controlar o prevenir estas molestias
- **Orina descolorida** – Orina puede ser rosa o roja hasta por 48 horas después de que reciba la droga.
- **Pérdida de pelo** – La pérdida completa del pelo ocurre aproximadamente 2 o más semanas después de empezar el tratamiento. El pelo normalmente crece otra vez después de terminar su tratamiento.
- **Recuento globular bajo** – Esto ocurre normalmente 1-2 semanas después del tratamiento. Durante este tiempo, usted estará más propenso a catarros, infecciones, y hemorragias. Puede ocurrir 14-28 días después del tratamiento.
- **Herpes labiales** – Se pueden empeorar a medida que continua el tratamiento.
- **Daño al músculo del corazón** – Esto puede ocurrir. Normalmente se hacen estudios antes de que esta droga sea administrada, en varias ocaciones durante el tratamiento, y después de terminar el tratamiento para determinar como trabaja su corazón.
- **Sensibilidad al sol** – No se exponga al sol por largo tiempo porque su piel es más sensible al sol; se puede quemar más fácilmente. Siempre use bronceador con filtro para el sol cuando se exponga al sol.

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

Notifique a su doctor o enfermera especializada en oncología inmediatamente si tiene estas dificultades:

- Señal de infección: Escalofrio o fiebre más alta de 100.5°F, tos nueva o agravada o falta de aliento, dolor o ardor al orinar, un herpe hinchado o rojo; áreas blancas en la boca o en la lengua
- Señal de hemorragia: sangrar por la nariz y que no para cuando aplica presión; sangre en la orina o en el excremento; encías que sangran; moretones raros; marcas rojas o moradas en el cuerpo; o cortaduras que no dejan de sangrar por más tiempo de lo normal.
- Si siente que pierde el aliento o si se le inflaman los tobillos
- Náusea y vómito que no puede controlar o si no puede comer o beber por 24 horas
- Si el lugar donde recibió la inyección se pone rojo, hinchado, o dolotido.

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- **Métodos anticonceptivos** son necesarios durante y por 4 meses después del tratamiento porque el tratamiento puede modificar la esperma y óvulos.
- **Antes de cualquier consulta dental, dígale a su dentista que está tomando esta medicina.**
- **Esta droga puede irritar su piel si se derrama fuera de la vena. NOTIFIQUE A SU ENFERMERA INMEDIATAMENTE SI SIENTE ARDOR, PICADURA, O DOLOR CUANDO LE ADMINISTRAN LA DROGA.**