French Hospital Medical Center.
A Dignity Health Member

Si tiene alguna pregunta, por favor consulte con su medico o llame al programa del cuidado para el cáncer a Hearst Cancer Resource Center al 805.542.6234.
Para emergencias, llame al 911.

EDUCACION PARA PACIENTES

Fludarabine (Fludara, FAMP)

EFECTOS SECUNDARIOS

Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetas médicas cuidadosamente. Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:

- **Recuento globular bajo** – Esto es temporal y puede ocurrir 1-2 semanas después de tomar esta droga. Durante este tiempo, usted estará más propenso a catarros, infecciones, y hemorragias. Se pueden hacer análisis de sangre para evaluar su recuento globular.
- **Náusea y vómito** – Normalmente es en moderación; se le dará medicación para ayudar a controlar o prevenir estas molestias.
- **Edema** – Puede notar que los pies of manos están más hinchados. Esto es debido a retención de aqua; normalmente es con moderación.
- **Daño del sistema nervioso -** ocurre raramente; puede haber entumecimiento; cambios en su vista; fatiga o debilidad extremada, o contracciones nerviosas. Ocurre 21-60 dias después del primer tratamiento.
- **Pérdida de pelo** – Puede ser que la cantidad del pelo le disminuya. Esto es temporario y le crecerá después que termine el tratamiento.

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

Notifique a su doctor o enfermera especializada en oncología inmediatamente si tiene estas dificultades:

- Señal de infección: Escalofrio o fiebre más alta de 100.5°F, tos nueva o agravada o falta de aliento, dolor o ardor al orinar, un herpe hinchado o rojo; áreas blancas en la boca o en la lengua
- Señal de hemorragia: sangrar por la nariz y que no para cuando aplica presión; sangre en la orina o en el excremento; encías que sangran; moretones raros; manchas rojas o moradas en el cuerpo; o cortaduras que no dejan de sangrar por más tiempo do lo normal
- Hinchazón excesiva de las manos, pies, o piernas que es excesiva o si persiste
- Náusea o vómito persistente o si no puede comer o beber por 24 horas.
- Diarrea persistente
- Falta de aliento o tos
- Ataques

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- **Métodos anticonceptivos** son necesarios durante y por 4 meses después del tratamiento porque puede haber modificaciones de la esperma y óvulos.
- **Antes de cualquier consulta dental, dígale a su dentista que está tomando esta medicina.**