French Hospital Medical Center.
A Dignity Health Member

Si tiene alguna **pregunta, por favor consulte con su medico o llame al programa del cuidado para el cáncer de Hearst Cancer Resource Center al 805.542.6234.**
Para emergencias, llame al 911.

EDUCACION PARA PACIENTES

Halotesin (Fluoxymesterone, ORA-Testryl)

EFECTOS SECUNDARIOS

Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetas médicas cuidadosamente. Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:

- **Facciones masculinas** – Pueden ocurrir en mujeres después de usar esta droga por más de tres meses (pueden incluir más pelo en la cara, cambio de voz, músculos y venas más pronunciadas, caida del pelo de la cabeza, y más pelo en el cuerpo).
- **Aumento de deseo sexual** – Puede ocurrir
- **Acné** – Puede ocurrir o emperorarse.
- **Retención de liquidos** – Puede ocurrir.
- **Aumento de calcio** – Puede ser que el calcio en su sangre aumente mientras está tomando esta droga, especialmente durante las primeras semanas del tratamiento. Reporte si tiene más sed, somnolencia, estreñimiento, o más cantidad de orina.
- **Náusea y Vómito** – Puede ocurrir pero no es común. Si esto sucede, repórtelo a su doctor para que le recete medicina.
- **Piel amarilla con picazón** – Puede ocurrir y puede ser debido a problemas en el higado.

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

Notifique a su doctor o enfermera especializada en oncología inmediatamente si tiene estas dificultades:

- Si sube de peso o si tiene hinchazón en las manos o tobillos.
- Si tiene más sed, somnolencia, estreñimiento, y si aumenta la cantidad de orina
- Si tiene náusea o vómito
- Piel amarilla con picazón
- Irregularidades con la regla

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- **Métodos anticonceptivos** son necesarios durante y por 4 meses despues del tratamiento porque el tratamiento puede poner en peligro la salud del esperma y óvulos.
- **Antes de cualquier consulta dental, dígale a su dentista que está tomando esta medicina.**