French Hospital Medical Center.
A Dignity Health Member

Si tiene alguna **pregunta, por favor consulte con su medico o llame al programa del cuidado para el cáncer de Hearst Cancer Resource Center al 805.542.6234.**
Para emergencias, llame al 911.

EDUCACION PARA PACIENTES

Hexamethylmelamine (Altretamine, HMM, HXM, Hexale

EFECTOS SECUNDARIOS

Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetas médicas cuidadosamente. Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:

- **Náusea y vómito –** Puede ocurrir pero por lo general empieza 2-3 días después del tratamiento.
- **Pérdida de apetito**
- **Sensación de hormigueo o si se le duermen las manos y pies –** Esto ocurre cuando toma la droga por tiempo prolongado pero al descontinuar o disminuir la dosis estos síntomas cambian.
- **Recuento globular bajo –** Ocurre 1-2 semanas después del tratamiento. Durante este tiempo, usted puede correr el riesgo de hemorragias o infecciones. Su doctor puede hacerle análisis de sangre para evaluar su recuento globular.
- **Inflamación de la vejiga**
- **Sarpullido en la piel**
- **Enzimas anormales del hígado**
- **Diarrea/Dolor abdominal**
- **Cambios mentales –** Confusión, inquietud, alucinaciones, depresión, y/o ansiedad que normalmente disminuye cuando se suspende la droga.
- **Daño leve al riñon**
- **Pérdida de pelo –** Puede ocurrir pero no es permanente

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

Notifique a su doctor o enfermera especializada en oncología inmediatamente si tiene estas dificultades:

- Señal de infección: Escalofrio o fiebre más alta de 100.5°F, tos nueva o agravada o falta de aliento, dolor o ardor al orinar, un herpe hinchado o rojo; areas blancas en la boca o en la lengua
- Náusea o vómito incontrolable o si no puede comer o beber por 24 horas
- Cualquier moretón o hemorragia rara
- Diarrea o dolor abdominal que persiste
- Sensacíon de hormigueo o si se le duermen las manos y pies
- Si la cantidad de orina cambia o si hay sangre en la orina
- Confusión, inquietud, depresión, y cambios mentales

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- **Métodos anticonceptivos** son necesarios durante y por 4 meses después del tratamiento porque el tratamiento puede poner en peligro la salud del esperma y óvulos.
- **Antes de cualquier consulta dental, dígale a su dentista que está tomando esta medicina.**