French Hospital Medical Center.
A Dignity Health Member

Si tiene alguna **pregunta, por favor consulte con su medico o llame al programa del cuidado para el cáncer a Hearst Cancer Resource Center al 805.542.6234.**
Para emergencias, llame al 911.

EDUCACION PARA PACIENTES

Interferon (Roferon-A or Intron)

EFECTOS SECUNDARIOS

Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetas médicas cuidadosamente. Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:

- **Síntomas similares a los de la gripe** – Por las primeras 24 horas después de recibir esta droga es posible que se sienta como si tuviera gripe. Puede tener fiebre, escalofríos, dolor de cabeza y dolor muscular. Tome Tylenol cada 4 horas por las primeras 24 horas después de tomar esta droga si se lo receeta su doctor. Estos síntomas disminuyen en pocas semanas.
- **Depresión**
- **Fatiga –** Puede aumentar a medida que continuen sus tratamientos. Tome descansos y siestas.
- **Náusea/Diarrea –** Puede ocurrir. Pida medicina para este síntoma.
- **Pérdida de apetito –** Puede ser que no sienta ganas de comer mientras esté en este tratamiento. Es importante que coma pequeña cantifad de alimentos a menudo para evitar pérdida de peso.
- **Recuento globular bajo –** Es temporal y usted puede correr el riesgo de hemorragias o infecciones. Su doctor puede hacerle análisis de sangre para evaluar su recuento globular.
- **Pérdida de pelo –** Su pelo puede disminuir pero crece con el tiempo.
- **Piel seca y con picor –** Puede ocurrir – cambie el sitio de la inyección y evite baños de tina muy calientes o por largo tiempo.

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

Notifique a su doctor o enfermera especializada en oncología inmediatamente si tiene estas dificultades:

- Señal de infección: Escalofrio o fiebre más alta de 100.5°F, tos nueva o agravada o falta de aliento, dolor o ardor al orinar, un herpe hinchado o rojo; áreas blancas en la boca o en la lengua
- Señal de hemorragia: Sangre en el excremento o en la orina; encías que sangran; sangre por la nariz; moretones raros
- Fatiga muy severa
- Si pierde 5 libras de peso o más en una semana
- Depresión, cambrios de ánimo severos, confusión

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- **Métodos anticonceptivos** son necesarios durante y por 4 meses después del tratamiento porque el tratamiento puede poner en peligro la salud del esperma y óvulos.
- **Antes de cualquier consulta dental, dígale a su dentista que está tomando esta medicina.**
- La mayoria de los síntomas causados por esta droga disminuyen y por lo general desaparecen con el tiempo. Tylenol puede ayudarle a controlar estos síntomas