French Hospital Medical Center.
A Dignity Health Member

Si tiene alguna **pregunta, por favor consulte con su medico o llame al programa del cuidado para el cáncer a Hearst Cancer Resource Center al 805.542.6234**
**Para emergencias, llame al 911.**

# EDUCACION PARA PACIENTES

**Irinotecan (Camptosar, CPT 11)**

## EFECTOS SECUNDARIOS

**Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetas médicas cuidadosamente. Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:**

- **Diarrea** – Hay dos clases de diarrea relacionados con esta droga. Una empieza durante o en 24 horas del tratamiento. Puede que sienta sudor y dolor abdominal con este tipo de diarrea. El segundo tipo que comienza mucho después, ocurre más 25 horas después de tomar esta droga y empieza por lo general 11 días despues de la primera dosis. Este tipe puede ser más prolongado y severo y puede causar deshidratación muy peligrosa para su vida si no es atendida. TOME LA MEDICINA QUE LE DE EL DOCTOR EXACTAMENTE COMO ES RECETADA.
- **Recuento globular bajo** – Esta droga causará que su recuento globular baje en 2-3 semanas después del tratamiento. Durante este tiempo, usted puede correr el riesgo de hemorragias o infecciones. Se le harán análisis de sangre frecuentemente para checar su recuento globular.
- **Náusea y Vómito** – Puede empezar durante su tratamiento y puede durar por 24-36 horas. Puede ser leve o severo. Se le dará medicina para ayudar a prevenir o aliviar estos síntomas.
- **Pérdida de pelo** – Es posible que lo pierda parcialmente o completamente mientras tome esta droga. El pelo crece por lo regular después de que termina de tomar esta droga.

## RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

**Notifique a su doctor o enfermera especializada en oncología inmediatamente si tiene estas dificultades:**

- Diarrea persistente
- Señal de infección: Escalofrio o fiebre más alta de 100.5°F, tos nueva o agravada o falta de aliento, dolor o ardor al orinar, un herpe hinchado o rojo; áreas blancas en la boca o en la lengua
- Señal de hemorragia: Sangre en el excremento o en la orina; encías que sangran; sangre por la nariz; moretones raros, manchas rojas o moradas en el cuerpo, o cortaduras que no curan o continúan sangrando
- Vómito persistente
- Extremada fatiga, debilidad física, o mareos
- Disminución de la cantidad de orina

## INSTRUCCIONES ESPECIALES

- **Métodos anticonceptivos** son necesarios durante y por 4 meses después del tratamiento porque el tratamiento puede poner en peligro la salud del esperma y óvulos.
- **Antes de cualquier consulta dental, dígale a su dentista que está tomando esta medicina.**
- Tome suficientes líquidos. Evite laxativos, bevidas con alcohol o cafeína, jugo de ciruela, comidas con alto contenido de fibra, y comidas picantes, grasosas, o fritas.