French Hospital Medical Center.
A Dignity Health Member

Si tiene alguna **pregunta, por favor consulte con su medico o llame al programa del cuidado para el cáncer a Hearst Cancer Resource Center al 805.542.6234**
Para emergencias, llame al 911.

EDUCACION PARA PACIENTES

Leustatin (Cladribine)

EFECTOS SECUNDARIOS

Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetas médicas cuidadosamente. Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:

- **Recuento globular bajo –** Esto es temporal. Durante este tiempo, usted puede correr el riesgo de hemorragias o infecciones. Su doctor puede hacerle análisis de sangre para evaluar su recuento globular.
- **Fiebre –** Esto ocurre por lo general durante el primer mes del tratamiento.
- **Sarpullido –** leve.
- **Náusea Leve –** Puede ocurrir. Puede ser que necesite medicina par ayudar a controlar y prevenir estos síntomas.
- **Fatiga –** Común.
- **Dolor de cabeza –** Ocasionalmente
- **Falta de apetito**
- **Reacción en el lugar donde recibió la inyección**

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

Notifique a su doctor o enfermera especializada en oncología inmediatamente si tiene estas dificultades:

- Señal de infección: Escalofrio o fiebre más alta de 100.5°F, tos nueva o agravada o falta de aliento, dolor o ardor al orinar, un herpe hinchado o rojo; áreas blancas en la boca o en la lengua
- Ronchas que no tenía
- Si sangra en forma inesperada
- Náusea y vómito incontrolable o si no puede comer o beber por 24 horas.
- Enrojecimiento, dolor, o hinchazón en donde le pusieron la inyección

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- **Métodos anticonceptivos** son necesarios durante y por 4 meses después del tratamiento porque el tratamiento puede modificar la esperma y los óvulos.
- **Antes de cualquier consulta dental, dígale a su dentista que está tomando esta medicina.**