French Hospital Medical Center.
A Dignity Health Member

Si tiene alguna **pregunta, por favor consulte con su medico o llame al programa del cuidado para el cáncer a Hearst Cancer Resource Center al 805.542.6234.**
Para emergencias, llame al 911.

EDUCACION PARA PACIENTES

Megace (Megastrol Acetate)

EFECTOS SECUNDARIOS

Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetas médicas cuidadosamente. Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:

- **Retención de líquidos** – Puede notar hinchazón en los tobillos y manos y también que sube de peso. Si los tobillos se le hinchan, elévelos tanto como pueda. Su peso tiene que ser controlado.
- **Aumento de apetito** – Puede que note que su apetito aumenta y que tiene más tejido adiposo (gordura). Esta medicina cambia la manera en que su cuerpo descompone la grasa en su comida. Una vez que termine el tratamiento, puede que esto se normalize.
- **Efectos en el higado** – Puede que su piel y la parte blanca de sus ojos se pongan amarillons. Estos son temporarios y disminuirán pocas semans después que termine de tomar esta droga. Estos efectos con causados porque la medicina se procesa en el hígado
- **Náusea leve** – Puede ocurrir.
- **Fatiga –** Puede ocurrir
- **Subir de peso** - Causado por el aumento de apetito.
- **Hemorragia –** entre los períodos
- **Dolor de espalda o cabeza**

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

Notifique a su doctor o enfermera especializada en oncología inmediatamente si tiene estas dificultades:

- Si la piel o los ojos se le ponen amarillos
- Aumento de náusea o fatiga
- Retención de líquidos inesperada o severa
- Falta de aliento con esfuerzo físico o tos
- Dolor, hinchazón, o rojez en donde le pusieron la inyección

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- **Métodos anticonceptivos** son necesarios durante y por 4 meses después del tratamiento porque el tratamiento puede modificar le esperma y los óvulos.
- **Antes de cualquier procedimiento dental, dígale a su dentista que está tomando esta medicina.**