

Si tiene alguna **pregunta**,
**por favor consulte con su
medico o llame al programa
del cuidado para el cáncer a Hearst
Cancer Resource Center al
805.542.6234**
Para emergencias, llame al 911.

EDUCACION PARA PACIENTES

Mercaptopurine (6-Mercaptopurine, 6 MP)

EFFECTOS SECUNDARIOS

Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetas médicas cuidadosamente. Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:

- **Recuento globular bajo** – Esto es temporario y puede ocurrir una semana después de tomar esta droga. Duranate este tiempo, usted estará más propenso a catarros, infecciones, y hemorragias. Le evaluarán su recuento globular frecuentemente.
- **Náusea leve y esporádica** – Le darán medicina para ayudar a controlar o prevenir estas molestias
- **Herpes labiales**
- **Diarrea**
- **Fiebre y dolor de cabeza**
- **Sarpullido, piel reseca, piel más oscura** – Evite baños de tina largos y calientes
- **Problemas de los riñones** – Le harán analálisis de sangre y orina periódicamente para checar el estado de sus riñones.
- **Piel y ojos amarillentos**
- **Falta de apetito**
- **Debilidad**

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

Notifique inmediatamente a su doctor o enfermera especializada en oncologia si tiene estas dificultades:

- Señal de infección: Escalofrío o fiebre más alta de 100.5°F, tos nueva o agravada o falta de aliento, dolor o ardor al orinar, un herpe hinchado o rojo; áreas blancas en la boca o en la lengua
- Señal de hemorragia: Sangre en el excremento o en la orina; encías que sangran; sangre por la nariz; moretones raros; manchas rojas o moradas en el cuerpo o una cortadura que toma mucho tiempo para dejar de sangrar
- Náusea y vómito incontrolable o si no puede comer o beber por 24 horas
- Sarpullido
- Piel y ojos amarillentos

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- **Métodos anticonceptivos** son necesarios durante y por 4 meses después del tratamiento porque el tratamiento puede modificar la esperma y los óvulos.
- **Antes de cualquier consulta dental, digale a su dentista que está tomando esta medicina.**