French Hospital Medical Center.
A Dignity Health Member

Si tiene alguna **pregunta, por favor consulte con su medico o llame al programa del cuidado para el cáncer a Hearst Cancer Resource Center al 805.542.6234**
Para emergencias, llame al 911.

EDUCACION PARA PACIENTES

Methotrexate (MTX, Mexate)

EFECTOS SECUNDARIOS

Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetas médicas cuidadosamente. Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:

- **Recuento globular bajo** – Esto es temporario y puede ocurrir 7-9 días después de tomar esta droga. Durante este tiempo, usted estará más propenso a catarros, infecciones, y hemorragias. Le evaluarán su recuento globular frecuentemente.
- **Náusea y vómito –** Es leve por lo general poro le darán medicina para ayudar a controlar o prevenir estas molestias.
- **Anorexia** – Por lo general es leve.
- **Herpes labiales** – Puede que sus labios y boca se vean rojos y se sientan adoloridos una semana despues de recibir esta droga. También le pueden salir úlceras o ampollas en los labios, lengua, y adentro de la boca.
- **Diarrea** – Es común. Puede que necesite ir al baño más frequentemente cada día; el excremento pude ser más suelto y aguado. Esta condición no está relacionada con dolores abdominales o hinchazón.
- **Cambios en la piel** – Ocurren 1-5 días después del tratamiento. Su piel será más sensible al sol o rayos ultravioleta; le puede salir sarpullido parecido a quemadura del sol; tiene que usar ropa que lo proteja y bronceador con filtro si se expone al sol.
- **Pérdida de pelo temporaria** – Ocurre raramente pero si sucede, el pelo crecerá cuando el tratamiento termine.

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

Notifique inmediatamente a su doctor o enfermera especializada en oncología si tiene estas dificultades:

- Náusea y vómito incontrolable o si no puede comer o beber por24 horas
- Sangre en la orina o excremento o cualquier hemorragia fuera de lo normal
- Señal de infección: Escalofrio o fiebre más alta de 100.5°F, tos nueva o agravada o falta de aliento, dolor o ardor al orinar, un herpe hinchado o rojo; areas blancas en la boca o en la lengua
- Si tiene que evacuar cuatro veces más de lo que es normal para usted
- Herpes labiales como los descritos arriba

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- **Métodos anticonceptivos** son necesarios durante y por 4 meses después del tratamiento porque el tratamiento puede poner en peligro la salud del esperma y óvulos.
- **Antes de cualquier tratamiento dental, dígale a su dentista que está tomando esta medicina.**