French Hospital Medical Center.
A Dignity Health Member

Si tiene alguna **pregunta, por favor consulte con su medico o llame al programa del cuidado para el cáncer a Hearst Cancer Resource Center al 805.542.6234.**
Para emergencias, llame al 911.

EDUCACION PARA PACIENTES

Mithramycin (Plicamycin, Mithracin)

EFECTOS SECUNDARIOS

Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:

- **Náusea leve y esporádica** – Esto puede empezar 6 horas después del tratamiento y dura 12-24 horas. Le darán medicina para ayudar a controlar o prevenir estas molestias.
- **Falta de apetito** – Es común
- **Diarrea**
- **Herpes labiales**
- **Pérdida de Pelo** – Puede ocurrir pero es temporal. Empieza 3 semanas después del tratamiento.
- **Recuento globular bajo** – Esto es temporario y ocurre 7-14 días después del tratamiento. Durante este tiempo, usted estará más propenso a catarros, infecciones, y hermorragias. Le evaluarán su recuento globular frecuentemente.
- **Interferencia con la coagulación de la sangre** – observe y mencione si tiene cualquier hemorragia fuera de lo común
- **Irritación de las venas donde le pusieron la inyección** – Esta medicina irrita la vena donde recibe la inyección. Si se derrama fuera de la vena, puede quemar o dañar los tejidos alrededor de esa área. Cuando reciba esta medicación se lo revisará cuidadosamente. TIENE QUE COMUNICAR CUALQUIER DOLOR O MOLESTIA A LA ENFERMERA CUANDO ESTE RECIBIENDO ESTA DROGA.
- **Sabor metálico**

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

Notifique inmediatamente a su doctor o enfermera especializada en oncología si tiene estas dificultades:

- Enrojecimiento, dolor, o ardor en donde le ponen la inyección
- Náusea o vómito incontrolable o si no puede come o beber por 24 horas
- Señal de hemorragia: Sangre en el excremento o en la orina; encías que sangran; sangre por la nariz; moretones raros
- Señal de infección: Escalofrío o fiebre más alta de 100.5°F, tos nueva o agravada o falta de aliento, dolor o ardor al orinar, un herpe hinchado o rojo; áreas blancas en la boca o en la lengua
- Diarrea incontrolable
- Cambios en la cantidad de orina

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- **Métodos anticonceptivos** son necesarios durante y por 4 meses después del tratamiento porque el tratamiento puede modificar la esperma y los óvulos.
- **Si esta droga se derrama fuera de la vena, puede quemar o dañar los tejidos alrededor de esa area. Tiene que comunicar INMEDIATAMENTE cualquier dolor o molestia en donde le ponen la inyección.**
- **Antes de cualquier tratamiento dental, dígale a su dentista que está tomando esta medicina**