French Hospital Medical Center.
A Dignity Health Member

Si tiene alguna **pregunta, por favor consulte con su medico o llame al programa del cuidado para el cáncer a Hearst Cancer Resource Center al 805.542.6234 Para emergencias, llame al 911.**

EDUCACION PARA PACIENTES

Nitrogen Mustard (Mechlorethamine, Mustargen)

EFECTOS SECUNDARIOS

Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetas médicas cuidadosamente. Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:

- **Recuento globular bajo** – Esto es temporario y puede ocurrir 7-14 días después del tratamiento. Durante este tiempo, usted estará más propenso a catarros, infecciones, y hemorragias. Le evaluarán su recuento globular frecuentemente.
- **Náusea y vómito** – Puede ser moderado o severo y empieza 1-3 horas después de recibir la droga y puede durar 1-2 días. Le darán medicina para ayudar a controlar o prevenir estas molestias.
- **Diarrea** – Puede ser leve o moderada y puede durar 1-2 días después del tratamiento. Se puede controlar con medicina por lo general.
- **Cambios de apetito** – Frecuentemente, sabor metálico en la boca.
- **Cambios en el ciclo menstrual** – Puede que tenga irregularidades o que no tenga menstruación mientras tome esta droga. Esto no significa que no se puede embarazar.
- **Redución del esperma en los hombres**.
- **Irritación o daño en el lugar de la inyección** – Esta droga es MUY irritante a las venas y causará daño si se derrama fuera de la vena durante la inyección. Tiene que reportar cualquier dolor o quemazón a la enfermera INMEDIATAMENTE si sente esto cuando le ponen la inyección.
- **Efectos poco communes** – Raramente, pacientes que reciben esta droga sienten dolores de cabeza, mareos, debilidad, zumbido en los oídos, fiebre, piel y ojos amarillentos. Se la observará para evaluar si tiene estos síntomas.

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

Notifique a su doctor o enfermera especializada en oncología inmediatamente si tiene estas dificultades:

- Rojez, dolor, hinchazón en donde le ponen la inyección
- Náusea y vómito incontrolable o si no puede comer o beber por 24 horas
- Señal de infección: Escalofrio o fiebre más alta de 100.5°F, tos nueva o agravada o falta de aliento, dolor o ardor al orinar, un herpe hinchado o rojo; áreas blancas en la boca o en la lengua
- Señal de hemorragia: Sangre en el excremento o en la orina; encías que sangran; sangre por la mariz; moretones raros
- Sarpullido o si la piel y ojos se ponen amarillos

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- **Métodos anticonceptivos** son necesarios durante y por 4 meses despues del tratamiento porque el tratamiento puede modificar la esperma y los óvulos.
- Si siente algun dolor o molestia en donde le ponen la inyección, dígale al doctor o enfermera INMEDIATAMENTE.
- Si donde le ponen la inyección está adolorido, póngase una toalla húmeda varias veces al día entre tratamientos. Esto le ayudará a disminuir la hinchazón y el dolor.