French Hospital Medical Center.
A Dignity Health Member

Si tiene alguna **pregunta, por favor consulte con su medico o llame al programa del cuidado para el cáncer a Hearst Cancer Resource Center al 805.542.6234.**
Para emergencias, llame al 911.

EDUCACION PARA PACIENTES

Procarbazine (Matulane)

EFECTOS SECUNDARIOS

Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetas médicas cuidadosamente. Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:

- **Recuento globular bajo** – Esto es temporario y puede ocurrir 2-4 semanas despues de comenzar esta medicina. Durante este tiempo, usted estará más propenso a catarros, infecciones, y hemorragias. Le checaran su recuento globular frecuentemente.
- **Náusea y vómito –** Puede ser moderado o leve. Si toma la medicina antes de dormir, puede disminuir estos efectos. Le darán medicina para ayudar a controlar o prevenir estas molestias.
- **Efectos de l sistema nervioso –** Puede sentir que se le duermen las puntas de los dedos, debilidad de los músculos, dificultad para caminar. Si siente que tiene cambios de ánimo, depresión, o somnolencia, notifiqueselo a su doctor o enfermera inmediatamente.
- **Reacciones de la piel –** Puede que le salga un sarpullido rojizo o sienta comezón. Algunas partes de su cuerpo pueden ponerse más oscuras. Si la comezón es severa o le causa muchas molestias, se le puede dar medicina pare disminuir este efecto.
- **Boca adolorida –** Puede sentir que la boca esta seca, adolorida, o rojiza. Pueden salir ampollas o úlceras blancas.
- **Pérdida del pelo –** Esto es poco común pero puede suceder. Si pierde el pelo, es termporario y le volverá a crecer.
- **Cambios en el ciclo menstrual**

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

Notifique inmediatamente a su doctor o enfermera especializada en oncología si tiene estas dificultades:

- Señal de infección: Escalofrio o fiebre más alta de 100.5°F, tos nueva o agravada o falta de aliento, dolor o ardor al orinar, un herpe hinchado o rojo; áreas blancas en la boca o en la lengua
- Señal de hemorragia: Sangre en el excremento o en la orina; encías que sangran; sangre por la nariz; moretones raros
- Si siente que se le duemen los dedos; si siente somnolencia, mareos, confusión, dolor de cabeza; si le cuesta trabajo caminar; vista desenfocada; dolor muscular severo, o contracciones nerviosas
- Náusea y vómito que persisten; úlceras blancas o ampollas en los labios
- Algunas drogas pueden reaccionar con Procarbazine. Hable con el doctor antes de tomar otras medicinas cuando este tomando Procarbazine.
- Evite las siguientes comidas: bebidas, alcohólicas, hígado, arenque en vinagre, aguacates, tomates, frijoles de vaina ancha, queso, yogur, higos plátanos, piña, limones, cafeína, café, bebidas con cola, chocolate.

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- **Métodos anticonceptivos** son necesarios durante y por 4 meses despues del tratamiento porque el tratamiento puede modificar la esperma y los óvulos.
- **Antes de cualquier tratamiento dental, dígale a su dentista que está tomando esta medicina.**