French Hospital Medical Center.
A Dignity Health Member

Si tiene alguna **pregunta, por favor consulte con su medico o llame al programa del cuidado para el cáncer a Hearst Cancer Resource Center al 805.542.6234.**
Para emergencias, llame al 911.

EDUCACION PARA PACIENTES

Streptozotocin (Zanosar)

EFECTOS SECUNDARIOS

Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetas médicas cuidadosamente. Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:

- **Náusea, vómito, y diarrea –** Náusea y vómito pueden empezar 2-4 horas después de la medicina. Puede que sienta estos síntomas por varios días. Le ofrecerán medicina para ayudar a controlar la náusea. Si tiene diarrea, puede sentirse major si toma líquidos y comidas blandas y poco condimentadas.
- **Herpes labiales –** Pacientes tienen estos efectos en diferentes intensidades – algunos tienen ampollas como de calor. Es importante que mantenga buena higiene de la boca para que se sienta mejor y para evitar infecciones. Use un cepillo de dientes suave. Si le cuesta trabajo comer, el doctor puede recetarle medicina para que se sienta mejor cuando come.
- **Daño al hígado –** Esta droga puede que disminuya la funcíon de los riñones. Se le harán análisis de orina y de sangre periódicamente para evaluar como funcionan los riñones mientras esté tomando esta droga.
- **Cambios en el nivel de azúcar en la sangre –** Esta droga cambia los niveles de azúcar en la sangre algunas veces. Los análisis de sangre también ayudarán a evaluar los niveles de azúcar en su sangre.
- **Recuento globular bajo –** Es temporario y puede ocurrir 10-14 días después del tratamiento. Durante este tiempo, usted estará más propenso a catarros, infecciones, y hemorragias. También puede tener la hemoglobina más baja.

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

Notifique a su doctor o enfermera especializada en oncología inmediatamente si tiene estas dificultades:

- Señal de infección: Escalofrio o fiebre más alta de 100.5°F, tos nueva o agravada o falta de aliento, dolor o ardor al orinar, un herpe hinchado o rojo; áreas blancas en la boca o en la lengua
- Señal de hemorragia: Sangre en el excremento o en la orina; encías que sangran; sangre por la nariz; moretones raros
- Ojos o piel amarillenta
- Si le disminuye la orina o se hinchan las piernas o pies
- Rojez, dolor, hinchazón en donde le ponen la inyección
- Herpes labiales
- Náusea o vómito incontrolable o si no puede comer o beber por 24 horas

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- **Métodos anticonceptivos** son necesarios durante y por 4 meses después del tratamiento porque el tratamiento puede modificar la esperma y los óvulos.
- **Antes de cualquier tratamiento dental, dígale a su dentista que está tomando esta medicina.**