French Hospital Medical Center.
A Dignity Health Member

Si tiene alguna **pregunta, por favor consulte con su medico o llame al programa del cuidado para el cáncer a Hearst Cancer Resource Center al 805.542.6234.**
**Para emergencias, llame al 911.**

# EDUCACION PARA PACIENTES

## Tamoxifen (Novaldex)

## EFECTOS SECUNDARIOS

**Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetas médicas cuidadosamente. Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:**

- **Náusea –** Puede ocurrir especialmente en los primeros meses de la terapia pero es por lo general leve y puede ser controlada con dieta y medicina.
- **Sofocos de calor –** Pueden ser leves o intensos. Si toma menos cafeína, alcohol, y disminuye la tensión estos síntomas ueden disminuir.
- **Sarpullido/comezón –** Es raro pero si ocurre comuníquele a su doctor.
- **Aumento de peso –** Puede notar que aumenta de peso. Sucede porque le aumenta el apetito y porque retiene mas líquidos en el cuerpo particulamente en los pies.
- **Hemorragia o descarga vaginal –** Es poco común; pero si ocurre, notifíqueselo a su doctor o enfermera inmediatamente. DEBE HACERSE un frotis cervical o examen pelvico anualmente mientras tome esta medicina si es que no ha tenido una histerectomía.
- **Sequedad de la vagina**
- **Dolor de cabeza**

## RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

**Notifique a su doctor o enfermera especializada en oncología inmediatamente si tiene estas dificultades:**

- Dolor o hinchazón de las piernas, confusión, vista desenfocada, falta de aliento repentina. Dolores de cabeza repentinos y fuera de lo normal
- Hemorragia o descarga vaginal
- Sofocos de calor severos
- Sarpullido
- Náusea y vómito incontrolable o si no puede comer o beber por 24 horas

## INSTRUCCIONES ESPECIALES

- **Antes de cualquier tratamiento dental, dígale a su dentista que está tomando esta medicina.**
- Tome le medicina a la misma hora cada día
- Use una crema hidratante líquida para la sequedad vaginal.
- **Métodos anticonceptivos** son necesarios durante y por 4 meses después del tratamiento porque el tratamiento puede modificar la esperma y los óvulos.
- ANTES de empezar esta droga, infórmele a su doctor si ha tenido coágulos de sangre