French Hospital Medical Center.
A Dignity Health Member

Si tiene alguna **pregunta, por favor consulte con su medico o llame al programa del cuidado para el cáncer a Hearst Cancer Resource Center al 805.542.6234.**
Para emergencias, llame al 911.

EDUCACION PARA PACIENTES

Taxotere (Docetaxel)

EFECTOS SECUNDARIOS

Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetas médicas cuidadosamente. Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:

- **Recuento globular bajo** – Esta droga puede bajarle el recuento globular temporalmente. Durante este tiempo, usted estará más propenso a catarros, infecciones, y hemorragias. Le evaluarán su recuento globular frecuentemente.
- **Retención de líquidos en el cuerpo** – Significa que su cuerpo está reteniendo agua de más. Si esto sucede alrededor del corazón o en el pecho, su vida puede estár en peligro. Señales de este efecto incluyen aumento de peso e hinchazón de las manos, pies, y piernas. Tal vez no lo note hasta el cuarto o quinto tratamiento.
- **Pérdida de pelo** – Pérdida de pelo empieza por lo general después del primer tratamiento e incluye el pelo de la cabeza, pestañas y cuerpo. El pelo crece después de terminar el tratamiento.
- **Dolor de músculas y huesos** – Ocasionalmente tendrá dolor muscular o de las coyunturas por 2-5 días despues de recibir Taxotere. Por lo general es leve o moderado y lo puede controlar con Tylenol.
- **Sarpullido** – Sarpullido que se ve como manchas o ronchitas puede salir en las manos y pies o también en el cuerpo y cara. Es común entre tratamientos.
- **Cambios de las uñas** – Pueden haber cambios en las uñas de las manos o de los pies. Algunas veces las uñas se caen pero una vez que la quimioterapia termine, crecen otra vez.
- **Fatiga** – Notará que se cansa más a menudo despues de los tratamientos. Si es severa o dura más tiempo de lo normal, notifiqueselo a su doctor.

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

Notifique a su doctor o enfermera especializada en oncología inmediatamente si tiene estas dificultades:

- Señal de infección: Escalofrio o fiebre más alta de 100.5°F, tos nueva o agravada o falta de aliento, dolor o ardor al orinar, un herpe hinchado o rojo; áreas blancas en la boca o en la lengua
- Señal de hemorragia; Sangre en el excremento o en la orina; encías que sangran; sangre por la nariz; moretones raros
- Sensación de calor, opresión en el pecho, o comezón durante la inyección de Taxotere o poco después.
- Hinchazón de la cara, manos, piernas, o pies que no se mejora después de dormir; si sube de peso abruptamente; falta de aliento que ocurre abruptamente, o una opresión.
- Sarpullido y cambios de las uñas
- Enrojecimiento, dolor, o hinchazón en donde le ponen la inyección.
- Fatiga severa.

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- **Métodos anticonceptivos** son necesarios durante y por 4 meses después del tratamiento porque el tratamiento puede modificar la esperma y los óvulos.
- **Antes de cualquier tratamiento dental, dígale a su dentista que está tomando esta medicina.**