French Hospital Medical Center.
A Dignity Health Member

Si tiene alguna **pregunta, por favor consulte con su medico o llame al programa del cuidado para el cáncer a Hearst Cancer Resource Center al 805.542.6234.**
Para emergencias, llame al 911.

EDUCACION PARA PACIENTES

Temodar (Temozolomide)

EFECTOS SECUNDARIOS

Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetas médicas cuidadosamente. Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:

- **Recuento globular bajo** – Esta droga baja su recuento globular temporariamente. Ocurre por to general aproximadamente la tercera semana después de recibir la droga. Durante este tiempo, usted estará más propenso a catarros, infecciones, y hemorragias. Le evaluarán su recuento globular frecuentemente.
- **Náusea y vómito –** Es común. Le darán medicina para ayudar a controlar o prevenir estas molestias. Parece que el tomar la medicina antes de dormir ayuda a prevenir la náusea.
- **Falta de apetito**
- **Dolor de cabeza**
- **Mareos**
- **Confusión**
- **Sarpullido**
- **Fatiga**

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

Notifique inmediatamente a su doctor o enfermera especializada en oncología si tiene estas dificultades:

- Señal de infección: Escalofrío o fiebre más alta de 100.5°F, tos nueva o agravada o falta de aliento, dolor o ardor al orinar, un herpe hinchado o rojo; áreas blancas en la boca o en la lengua
- Señal de hemorragia: Sangre en el excremento o en la orina; encías que sangran; sangre por la nariz; moretones raros
- Náusea o vómito incontrolable o si no puede comer o beber por 24 horas
- Informe a su doctor o enfermera cualquier cambio como confusión, mareos, depresión, inquietud, si camina con paso vacilante, etc.

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- **Métodos anticonceptivos** son necesarios durante y por 4 meses después del tratamiento porque el tratamiento puede modificar la esperma y los óvulos.
- **Antes de cualquier consulta dental, dígale a su dentista que está tomando esta medicina.**