French Hospital Medical Center.
A Dignity Health Member

Si tiene alguna **pregunta, por favor consulte con su medico o llame al programa del cuidado para el cáncer a Hearst Cancer Resource Center al 805.542.6234.**

EDUCACION PARA PACIENTES

Thalidomide (Thalomid)

EFECTOS SECUNDARIOS

Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetas médicas cuidadosamente. Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:

- **Somnolencia** – Muy común
- **Pies y manos dormidas o con sensasión de hormigueo**
- **Mareos**
- **Estreñimiento** – Común
- **Reacción alérgica** – Sarpullido rojo y con comezón; fiebre, ritmo del corazón acelerado, tensión baja
- **Náusea**
- **Debilidad, cansancio, pérdida de energía**
- **Hinchazón en las partes bajas de las piernas y las manos**

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

Notifique a su doctor o enfermera especializada en oncologia inmediatamente si tiene estas dificultades:

- Dedos de las manos o pies que se duermen, sensasión de hormigueo, o dolor; si no puede abrocharse los botones, etc.
- Mareos
- Si sospecha que está embarazada
- Sarpullido, fiebre
- Estreñimiento que no se mejora con una rutina de laxantes
- Hinchazón de los tobillos o manos

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- Tome la medicina antes de dormir para reducir los síntomas de mareos
- **Métodos anticonceptivos** son necesarios durante y por 4 meses después del tratamiento porque el tratamiento puede modificar la esperma y los óvulos.
- **Antes de cualquier tratamiento dental, dígale a su dentista que está tomando esta medicina.**
- NO USE BEBIDAS ALCOHOLICAS y otras drogas que causan somnolencia
- Use an laxante que sea suavizante o un producto con fibra para evitar el estreñimiento