French Hospital Medical Center.
A Dignity Health Member

Si tiene alguna **pregunta, por favor consulte con su medico o llame al programa del cuidado para el cáncer a Hearst Cancer Resource Center al 805.542.6234.**
Para emergencias, llame al 911.

EDUCACION PARA PACIENTES

Thioguanine (6-TG)

EFECTOS SECUNDARIOS

Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetas médicus cuidadosamente. Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:

- **Recuento globular bajo** – Su recuento globular puede bajar si toma dosis altas. Esto es temporario y se recuperará rápidamente.
- Le evaluarán su recuento globular frecuentemente.
- **Náusea y vómito –** Pueden ocurrir. Tal vez necesite tomar medicina para ayudar a controlar o prevenir estas molestias.
- **Cambios de la piel –** Sarpullido rojizo puede ocurrir.
- **Herpes labiales –** Mantenga buena higiene bocal y use cepillos de dientes suaves.
- **Fatiga**
- **Sensibilidad al sol** – Use un bronceador con filtro cuando está expuesto al sol.
- **Diarrea**

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

Notifique inmediatamente a su doctor o enfermera especializada en oncología si tiene estas dificultades:

- Señal de infección: Escalofrío o fiebre más alta de 100.5°F, tos nueva o agravada o falta de aliento, dolor o ardor al orinar, un herpe hinchado o rojo; áreas blancas en la boca o en la lengua
- Sarpullido Nuevo
- Cualquier hemorragia
- Si vomita la comida o la medicina
- Herpes labiales
- Fatiga, falta de aliento, mareos

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- **Métodos anticonceptivos** son necesarios durante y por 4 meses después del tratamiento porque el tratamiento puede modificar la esperma y los óvulos.
- **Antes de cualquier tratamiento dental, digale a su dentista que está tomando esta medicina.**
- Tome su dosis a la misma hora cada dia para obtener el óptimo resultado..