French Hospital Medical Center.
A Dignity Health Member

Si tiene alguna **pregunta, por favor consulte con su medico o llame al programa del cuidado para el cáncer a Hearst Cancer Resource Center al 805.542.6234.**
Para emergencias, llame al 911.

EDUCACION PARA PACIENTES

Vidaza (5-Azacitidine)

EFECTOS SECUNDARIOS

Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetas médicas cuidadosamente.
Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:

- **Náusea**
- **Glóbulos rojos bajos (Anemia)**
- **Plaquetas bajas (mayor riesgo de sangrar)**
- **Vómito**
- **Fiebre**
- **Glóbulos blancos bajos (mayor riesgo de infección)**
- **Diarrea**
- **Fatiga**
- **Enrojecimiento o dolor en el sitio de l inyección**
- **Estreñimiento**
- **Equimosis, Petequia (manchas rojas o moradas en la piel)**
- **Tos**
- **Falta de aliento**
- **Debilidad**
- **Escalofrio**
- **Artralgia y Mialgia (dolor de músculos y articulaciones)**
- **Dolor de cabeza**
- **Menos apetito**
- **Dolor de garganta**
- **Dolor de espalda**
- **Confusión; Mareos**
- **Hinchazón de tobillos**
- **Dolor de pecho**
- **Sangre por la nariz**
- **Pérdida de peso**
- **Dolor abdominal**
- **Sarpullido**
- **Angustia**
- **Potasio bajo**
- **Infección respiratoria**
- **Picazón**
- **Depresión**
- **Insomnio**

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

Notifique inmediatamente a su doctor o enfermera especializada en oncología si tiene estas dificultades:

- Náusea
- Vómito (mas de 4-5 veces en un período de 24 horas)
- Diarrea (mas de 4-6 episodios en un período de 24 horas)
- Cualquier moretón o hemorragia rara
- Sangre en el excremento o si está negro o muy obscuro
- Sangre en la orina
- Fatiga excesiva
- Estreñimiento
- Hinchazón de los pies o tobillos; aumento de peso repentino
- Infección; enrojecimiento o hinchazón, tos con flemas, o dolor al orinar
- Pérdida de apetito o deshidratación por 24 horas

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- **Métodos anticoncepetivos** son necesarios durante y por 4 meses después del tratamiento porque el tratamiento puede modificar la esperma y los óvulos.
- **Antes de cualquier tratamiento dental, dígale a su dentista que está tomando esta medicina.**