French Hospital Medical Center.
A Dignity Health Member

Si tiene alguna **pregunta, por favor consulte con su medico o llame al programa del cuidado para el cáncer a Hearst Cancer Resource Center al 805.542.6234.**
Para emergencias, llame al 911.

EDUCACION PARA PACIENTES

Vinblastine (Velban)

EFECTOS SECUNDARIOS

Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:

- **Recuento globular bajo** – Esto es temporario y puede ocurrir 1-2 semanas despues de recibir esta droga. Durante este tiempo, usted estará más propenso a catarros, infecciones, y hemorragias. Le evaluarán su recuento globular frecuentemente.
- **Pérdida del pelo** – Puede perder poco pelo o todo el pelo de la cabeza y el cuerpo. Esto es temporario y el pelo crecerá otra vez cuando termine el tratamiento.
- **Náusea y vómito** – Puede ser leve y puede ocurrir 1-2 días después de recibir la droga. Se puede controlar con medicina por lo general.
- **Daño a los nervios** – Puede notar que los nervios en las piernas y los brazos están afectados. Puede sentir que los dedos de las manos y los pies se le duermen o una sensación de hormigueo. También puede sentir debillidad, dificultad para caminar, estreñimiento, o dolores de cabeza. Estos cambios serán evaluados.
- **Dolor del tumor** – Ocasionalmente, pacientes, sienten más dolor donde tienen el tumor. Esto sucede en 1-3 minutos después de recibir la medicación. Es una sensación de ardor y puede durar por 30 minutos y hasta 3 horas.
- **Sensibilidad al sol** – Use bronceadores con filtro cuando se exponga al sol.
- **Estreñimiento**

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

Notifique inmediatamente a su doctor o enfermera especializada en oncología si tiene estas dificultades:

- Enrojecimiento, dolor, hinchazón en donde le ponen la inyección
- Señal de infección: Escalofrío o fiebre más alta de 100.5°F, tos nueva o agravada o falta de aliento, dolor o ardor al orinar, un herpe hinchado o rojo; áreas blancas en la boca o en la lengua
- Señal de hemorragia: Sangre en el excremento o en la orina; encías que sangran; sangre por la nariz; moretones raros
- Estreñimiento severo; dolor en el abdomen; inflamación abdomimal.
- Dificultad al orinar
- Si le cuesta trabajo caminar, agarrar objetos, abrocharse los botones
- Convulsiones, ataques, dolores de cabeza, cambios en la visión
- Ronchitas, comezón, falta de aliento, respiración silbante
- Más fatiga, falta de aliento, mareos

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- Aumente la cantidad de fibra en su dieta y tome suficientes líquidos.
- Tome laxantes como se los recetan
- Esta droga puede dañar su piel si se derrama fuera de la vena. PORFAVOR DÍGALE A SU ENFERMERA INMEDIATAMENTE SI SIENTE DOLOR EN DONDE RECIBE LA INYECCIÓN.
- **Métodos anticonceptivos** son necesarios durante y por 4 meses después del tratamiento porque el tratamiento puede modificar la esperma y los óvulos.
- **Antes de cualquier tratamiento dental, dígale a su dentista que está tomando esta medicina.**