French Hospital Medical Center.
A Dignity Health Member

Si tiene alguna **pregunta, por favor consulte con su medico o llame al programa del cuidado para el cáncer a Hearst Cancer Resource Center al 805.542.6234.**
Para emergencias, llame al 911.

EDUCACION PARA PACIENTES

Xeloda (Capecitabine)

EFECTOS SECUNDARIOS

Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetas médicas cuidadosamente. Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:

- **Diarrea** – Su doctor puede darle medicina para ayudar a controlar este efecto.
- **Náusea y vómito –** Su doctor le dará medicina para ayudar con esto
- **Herpes labiales y de la garganta**
- **Dolor abdominal**
- **Falta de apetito**
- **Deshidratación** – Tome suficientes líquidos
- **Dedos de los pies o manos que se duermen, con dolor, o con sensación de hormigueo**
- **Piel seca y con picazón**
- **Dolor de cabeza y mareos**
- **Cansancio** – Muy común.
- **Sensibilidad al sol** – Use mangas largas y bronceadores con filtro

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

Notifique inmediatamente a su doctor o enfermera especializada en oncología si tiene estas dificultades:

- Diarrea – Si tiene que ir al baño 4 veces o más al dia o si tiene diarrea en la noche
- Vómito – Más de una vez en un período de 24 horas
- Náusea – La cantidad de comida que come cada día es menos de lo normal
- Boca adolorida – Si tiene rojez, inflamación, o herpes labiales y si tiene dolor
- Fiebre o infección: Temperatura más alta de 100.5°F, escalofríos o tos nueva o agravada o falta de aliento, dolor o ardor al orinar, un herpe hinchado o rojo; áreas blancas en la boca o en la lengua
- Síndrome de la mano y el pie – Si las manos y los pies se ponen rojos e hinchados y si siente dolor.
- Si esta tomando Folic Acid (Leucovorin), Coumadin (Warfarin), Phenytoin (Dilantin), o Maalox.

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- **Métodos anticonceptivos** son necesarios durante y por 4 meses después del tratamiento porque el tratamiento puede modificar la esperma y los óvulos.
- **Antes de cualquier tratamiento dental, dígale a su dentista que está tomando esta medicina.**
- Pastillas orales se toman con un vaso de auga
- Tome pastillas solamente con aqua. Tomelas en los primeros 30 minutos después de terminar de desayunar o cenar.