French Hospital Medical Center.
A Dignity Health Member

Si tiene alguna **pregunta, por favor consulte con su medico o llame al programa del cuidado para el cáncer a Hearst Cancer Resource Center al 805.542.6234.**
Para emergencias, llame al 911.

EDUCACION PARA PACIENTES

Zoladex (Goserelin)

EFECTOS SECUNDARIOS

Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetas médicas cuidadosamente. Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:

- **Sofocos de calor** – Los hombres por lo general sienten sofocos de calor
- **Impotencia** – Hombres pueden notar una reducción de su erección, que crecen los senos, y que se sienten tiernos. Otro efecto es una reducción del deseo sexual.
- **Dolor de huesos** – No es común pero puede ser más frequente durante los primeros 8 días despues de la inyección.
- **Efectos de la inyección** – Dolor o moretón donde recibió la inyección. Estos síntomas son más communes en los primeros días despues de la inyección.
- **Náusea y vómito**
- **Estreñimiento y diarrea**
- **Retención de líquidos**
- **Cambios del ciclo menstrual**
- **Aumento de peso**

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

Notifique inmediatamente a su doctor o enfermera especializada en oncología si tiene estas dificultades:

- Sofocos de calor persistentes
- Dolor de huesos persistente
- Molestar, hemorragia fuera de lo normal, o drenaje fuera de lo normal en donde recibió la inyección
- Dificultad al respirar

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- **Métodos anticonceptivos** son necesarios durante y por 4 meses después del tratamiento porque el tratamiento puede modificar la esperma y los óvulos.
- **Antes de cualquier tratamiento dental, dígale a su dentista que está tomando esta medicina.**