Dignity Health

Si tiene alguna pregunta, por favor consulte con su medico o para emergencias, llame al 911.

EDUCACION PARA PACIENTES

Carboplatin (Paraplatin)

EFECTOS SECUNDARIOS

Es importante para el paciente seguir todas las indicaciones de sus recetes médicas cuidadosamente. Es posible que tenga algunos, todos, o ninguno de estos síntomas:

- **Náusea y vómito** – Este puede ocurrir despues de recibir esta droga y puede durar por 24 horas. Se le dará medicación para ayudar a controlar o prevenir estas molestias. Tome su medicación para controlar la náusea al pie de la letra.
- **Recuento globular bajo** – Ocurre 2-3 semanas después de recibir esta droga. Durante este tiempo, usted estará más propenso a catarros, infecciones, y hemorragias. Probablemente, su recuento globular será analizado periódicamente mientras reciba esta droga.
- **Fatíga** – Es común y puede incluír cansancio físico ó mental
- **Pérdida de apetito** – Normalmente mejora en 24 horas.
- **Cambios en el sentido del gusto**
- **Daño al óido** - Puede ocurrir con dosis altas. Los síntomas pueden incluir un silbidos en los oídos.
- **Dano a los riñones** – Puede occurrir, pero normalmene se puede prevenir con una receta de líquidos administrados vía intravenosa.
- **Péridida de Pelo** – Puede ocurrir pero no es común y si ocurre es mínimo. Este efecto es temporario.

RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE

Notifique a su doctor o enfermera especializada en oncología inmediatamente si tiene estas dificultades:

- Señal de infección: Escalofrío o fiebre más alta de 100.5°F, tos nueva o agravada o falta de aliento, dolor o ardor al orinar, un herpe hichado o rojo; áreas blancas en la boca o en la lengua
- Señal de hemorragia: sangrar por la nariz y que no para cuando aplica presión; sangre en la orina o en el excremento; encias que sangran; moretones raros; marcas rojas o moradas en el cuerpo; o cortaduras que no dejan de sangrar por más tiempo de lo normal.
- Cualquier cambio en sus oídos o si nota un silbidos en los oídos.
- Cualquier cambio o si disminucion de orina.
- Náusea o vómito excesivo o si no puede comer o beber por más de 24 horas.

INSTRUCCIONES ESPECIALES

- **Métodos anticonceptivos** son necesarios durante y por 4 meses después del tratamiento porque el tratamiento puede modificar la esperma y los óvulos.
- **Antes de cualquier consulta dental, dígale a su dentista que está tomando esta medicina.**
- Beba 10-12 vasos de líquidos diariamente para mantener sus riñones trabajando bien cuando esté tomando esta droga.